1. Calcule as seguintes integrais:

(a) **(1,5)** $\int \ln(x^2+4x+5)\,dx$

(b) **(1,5)** $\int \frac{x^5}{\sqrt{(4-x^2)^3}}\,dx$

(a) $\int \ln(x^2+4x+5)\,dx = x\ln(x^2+4x+5) - \int \frac{x(2x+4)}{x^2+4x+5}\,dx$

integração por partes

$u = \ln(x^2+4x+5)$

$du = \frac{2x+4}{x^2+4x+5}\,dx$

$dv = dx \qquad v = x$

Temos então que calcular $\int \frac{x^2+2x}{x^2+4x+5}\,dx$. Como o grau do numerador é igual ao grau do denominador, efetuamos a divisão:

$x^2+2x \;\big|\; x^2+4x+5$

$-x^2-4x \;\big|\; 1$

$-2x-5$

Logo $\int \frac{x^2+2x}{x^2+4x+5}\,dx = \int dx + \int \frac{-2x-5}{x^2+4x+5}\,dx.$

$= x - \int \frac{2x+5}{x^2+4x+5}\,dx.$

Calcular então $\int \frac{2x+5}{x^2+4x+5}\,dx = \int \frac{2x+5\,dx}{(x+2)^2+1} = \int \frac{(2y-4+5)\,dy}{y^2+1}$

$y = x+2$

$dy = dx$

$x = y-2$

$= \int \frac{2y\,dy}{y^2+1} + \int \frac{dy}{y^2+1}$

$= \ln(y^2+1) + \arctg y + C = \ln(x^2+4x+5) + \arctg(x+2) + C$

Portanto:

$$\int \ln(x^2+4x+5)\,dx = x\ln(x^2+4x+5) + 2\left[x - \ln(x^2+4x+5) - \arctg(x+2)\right] + k, \quad k \in \mathbb{R}$$

(b) $\int \frac{x^5\,dx}{\sqrt{(4-x^2)^3}} \overset{(*)}{=} \int \frac{2^5 \operatorname{sen}^5\theta \; 2\cos\theta \, d\theta}{2^3 \cos^3\theta}$.

(*) Substituição Trigonométrica

* $x = 2\operatorname{sen}\theta$, $\theta \in]-\pi/2, \pi/2[$

$dx = 2\cos\theta\, d\theta$

$\sqrt{4-x^2} = 2\cos\theta$



$$= 2^3 \int \frac{\operatorname{sen}^5\theta\, d\theta}{\cos^2\theta} = 2^3 \int \frac{(1-\cos^2\theta)^2 \operatorname{sen}\theta\, d\theta}{\cos^{2\cdot 2}\theta}$$

$$= 2^3 \left[\int \frac{1}{\cos^2\theta} \operatorname{sen}\theta\, d\theta - 2\int \operatorname{sen}\theta\, d\theta + \int \cos^2\theta \operatorname{sen}\theta\, d\theta \right]$$

$$= -2^3 \left[\int \frac{du}{u^2} - 2\int du + \int u^2\, du \right]$$

$u = \cos\theta$

$du = -\operatorname{sen}\theta\, d\theta$

$$= -2^3 \left[\frac{u^{-1}}{-1} - 2u + \frac{u^3}{3} \right] + C + C$$

$$= -2^3 \left[-\frac{1}{\cos\theta} - 2\cos\theta + \frac{\cos^3\theta}{3} \right] + C$$

$$= -2^3 \left[-\frac{2}{\sqrt{4-x^2}} - \frac{2\sqrt{4-x^2}}{2} + \frac{\left(\sqrt{4-x^2}\right)^3}{3 \cdot 8} \right] + C$$

Assim:

$$\int \frac{x^5}{\sqrt{(4-x^2)^3}}\, dx = \frac{16}{\sqrt{4-x^2}} + 8\sqrt{4-x^2} + \frac{\left(\sqrt{4-x^2}\right)^3}{3} + C$$

2. **(2,0)** Calcule a integral

$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sec^2(x)}{(\operatorname{tg}(x)-2)(\operatorname{tg}(x)-1)^2}\,dx.$$

Fazendo a substituição $t = \operatorname{tg} x$, temos $dt = \sec^2 x\,dx$,

$x = -\pi/4 \Rightarrow t = -1$ e $x = \pi/6 \Rightarrow t = 1/\sqrt{3}$

Assim, a integral fica $\int_{-1}^{1/\sqrt{3}} \frac{1}{(t-2)(t-1)^2}\,dt$.

Agora, $\frac{1}{(t-2)(t-1)^2} = \frac{A}{t-2} + \frac{B}{t-1} + \frac{C}{(t-1)^2} = \frac{A(t-1)^2 + B(t-1)(t-2) + C(t-2)}{(t-2)(t-1)^2}$

Resolvendo o sistema, obtemos $A = 1$, $B = -1$ e $C = -1$.

Portanto,

$$\int_{-1}^{1/\sqrt{3}} \frac{1}{(t-2)(t-1)^2}\,dt = \int_{-1}^{1/\sqrt{3}} \left(\frac{1}{t-2} - \frac{1}{t-1} - \frac{1}{(t-1)^2}\right) dt = \left(\ln|t-2| - \ln|t-1| + \frac{1}{t-1}\right)\Bigg|_{-1}^{1/\sqrt{3}}$$

$$= \ln\left(2 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) - \ln\left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{3}} - 1} - \ln 3 + \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

3. **(1,5)** Seja $F(x) = \int_0^{\sqrt{x}} (x + t^2)e^{t^2}\,dt$, $x > 0$. Determine $F'(x)$ e $F''(x)$.

$F(x) = x\int_0^{\sqrt{x}} e^{t^2}dt + \int_0^{\sqrt{x}} t^2 e^{t^2}dt$. As funções e^{t^2} e $t^2e^{t^2}$ são contínuas. Pelo TFC,

$$F'(x) = \int_0^{\sqrt{x}} e^{t^2}dt + xe^x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} + xe^x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \int_0^{\sqrt{x}} e^{t^2}dt + \sqrt{x}e^x$$

e

$$F''(x) = e^x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2\sqrt{x}}e^x + \sqrt{x}e^x = e^x\left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{x}\right)$$

(a) Esboço da região R



(b) V_x volume do sólido obtido pela rotação de R em torno do eixo x

$$V_x = \pi \int_1^e f(x)^2 dx - \pi \int_1^e g(x)^2 dx$$

A primeira integral:

$$\pi \int_1^e (3(x^2-1))^2 dx = 9\pi \int_1^e (x^4 - 2x^2 + 1)\, dx = 9\pi \left[\frac{x^5}{5} - \frac{2x^3}{3} + x\right]_1^e =$$

$$= 9\pi \left[\left(\frac{e^5}{5} - \frac{2e^3}{3} + e\right) - \left(\frac{1}{5} - \frac{2}{3} + 1\right)\right] = \frac{9\pi}{5} e^5 - 6\pi e^3 + 9\pi e - \frac{24}{5}\pi$$

A segunda integral será feita por partes:

$\ln x \xrightarrow{D} \frac{1}{x}$

$\ln x \xrightarrow{I} x\ln x - x$

$$\pi \int_1^e \ln^2 x\, dx = \underbrace{\pi \left[(\ln x)(x\ln x - x)\right]_1^e}_{\equiv 0} - \pi \int_1^e (\ln x - 1)\, dx$$

$$\pi \int_1^e \ln^2 x\, dx = -\pi \left[x\ln x - 2x\right]_1^e = -\pi \left[-e + 2\right] = \pi e - 2\pi$$

Assim, $V_x = \left(\frac{9\pi}{5} e^5 - 6\pi e^3 + 9\pi e - \frac{24\pi}{5}\right) - \left(\pi e - 2\pi\right)$

$$\boxed{V_x = \frac{9\pi}{5} e^5 - 6\pi e^3 + 8\pi e - \frac{12\pi}{5}}$$

(c) V_y = volume do pólido obtido pela rotação de R em torno do eixo y:

Primeira solução:





$$V_y = \pi\int_0^1 (e^y)^2\,dy - \pi\int_0^1 \left(\sqrt{\tfrac{y}{3}+1}\right)^2 dy + \pi e^2(3e^2-3-1) - \pi\int_1^{3(e^2-1)} \left(\sqrt{\tfrac{y}{3}+1}\right)^2 dy$$

$$V_y = \pi\left[\frac{e^{2y}}{2}\right]_0^1 - \pi\left[\frac{y^2}{6}+y\right]_0^1 + \pi e^2(3e^2-4) - \pi\left[\frac{y^2}{6}+y\right]_1^{3(e^2-1)}$$

$$V_y = \pi\left(\frac{e^2}{2}-\frac{1}{2}\right) - \pi\left(\frac{1}{6}+1\right) + \pi e^2(3e^2-4) - \pi\left[\frac{3(e^2-1)^2}{2} + 3(e^2-1) - \frac{1}{6} - 1\right]$$

$$\boxed{V_y = \frac{3\pi}{2}e^4 - \frac{7\pi}{2}e^2 + \pi}$$

Segunda solução: $V_y = 2\pi\int_1^e x\,3(x^2-1)\,dx - 2\pi\int_1^e x\ln x\,dx$

$$V_y = 2\pi\left[\frac{3x^4}{4} - \frac{3x^2}{2}\right]_1^e - 2\pi\int_1^e x\ln x\,dx$$

$$V_y = 2\pi\left[\left(\frac{3e^4}{4} - \frac{3e^2}{2}\right) - \left(\frac{3}{4}-\frac{3}{2}\right)\right] - 2\pi\int_1^e x\ln x\,dx$$

$$2\pi \int_1^e x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e \pi 2 - 2\pi \cdot \frac{1}{2} \int_1^e x \, dx$$

$$\ln x \xrightarrow{D} \frac{1}{x}$$

$$x \xrightarrow{\int} \frac{x^2}{2}$$

$$2\pi \int_1^e x \ln x \, dx = 2\pi \left(\frac{e^2}{2} \right) - \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^e$$

$$= \pi e^2 - \pi \left(\frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \right) = \frac{\pi e^2}{2} + \frac{\pi}{2}$$

Assim,

$$V_y = 2\pi \left[\left(\frac{3e^4}{4} - \frac{3e^2}{2} \right) - \left(-\frac{3}{4} \right) \right] - \frac{\pi e^2}{2} - \frac{\pi}{2}$$

$$\boxed{V_y = \frac{3\pi}{2} e^4 - \frac{7\pi}{2} e^2 + \pi}$$

1. Calcule as seguintes integrais:

(a) **(1,5)** $\int \ln(x^2 - 4x + 5)\,dx$

(b) **(1,5)** $\int \frac{x^5}{\sqrt{(9 - x^2)^3}}\,dx$

(a) $\int \underbrace{\ln(x^2-4x+5)}_{u}\underbrace{dx}_{dv} = x\ln(x^2-4x+5) - \int \frac{x(2x-4)}{x^2-4x+5}\,dx$

Utilizar integração por partes:

$u = \ln(x^2-4x+5)$

$du = \frac{2x-4}{x^2-4x+5}\,dx$

$dv = dx$

$v = x$

$= x\ln(x^2-4x+5) - 2\int \frac{x^2-2x}{x^2-4x+5}\,dx$

Calcular $\int \frac{x^2-2x}{x^2-4x+5}\,dx \overset{(*)}{=} \int dx + \int \frac{2x-5}{x^2-4x+5}\,dx$

(*) Como o grau do numerador é igual ao grau do denominador, temos que efetuar a divisão

$$\begin{array}{r|l} x^2 - 2x & x^2-4x+5 \\ \hline -x^2+4x-5 & 1 \\ \hline 2x-5 & \end{array}$$

Calcular $\int \frac{2x-5}{x^2-4x+5}\,dx = \int \frac{2x-5}{(x-2)^2+1}\,dx \overset{\substack{y=x-2\\ dy=dx\\ x=y+2}}{=} \int \frac{2(y+2)-5}{y^2+1}\,dy$

$= \int \frac{2y}{y^2+1}\,dy - \int \frac{dy}{y^2+1} = \ln(y^2+1) - \operatorname{arctg} y + C$

$= \ln(x^2-4x+5) - \operatorname{arctg}(x-2) + C$

Assim

$$\int \ln(x^2-2x+5)\,dx = x\ln(x^2-4x+5) - 2\left[x + \ln(x^2-4x+5) - \operatorname{arctg}(x-2)\right] + k$$

(b) $\int \frac{x^5}{\sqrt{(9-x^2)^3}}\,dx \overset{(*)}{=} \int \frac{3^5 \operatorname{sen}^5\theta \; 3\cos\theta\, d\theta}{3^3 \cos^3\theta}$

(*) Substituição Trigonométrica

$x = 3\operatorname{sen}\theta \qquad -\pi/2 < \theta < \pi/2$

$dx = 3\cos\theta\, d\theta$

$\sqrt{9-x^2} = 3\cos\theta$



$= 3^3 \int \frac{\operatorname{sen}^5\theta}{\cos^2\theta}\,d\theta = 3^3 \int \frac{(1-\cos^2\theta)^2}{\cos^3\theta}\operatorname{sen}\theta\,d\theta$

$u = \cos\theta$

$du = -\operatorname{sen}\theta\, d\theta$

$= -3^3 \int \frac{(1-u^2)^2}{u^3}\,du = -3^3 \int \left(\frac{1}{u^3} - 2 + u^2\right) du$

$= -3^3 \left[-\frac{1}{u} - 2u + \frac{u^3}{3}\right] + C$

$= -3^3 \left[-\frac{1}{\cos\theta} - 2\cos\theta + \frac{\cos^3\theta}{3}\right] + C$

$= -3^3 \left[-\frac{3}{\sqrt{9-x^2}} - \frac{2\sqrt{9-x^2}}{3} + \frac{(\sqrt{9-x^2})^3}{3^4}\right] + C$

2. **(2,0)** Calcule a integral

$$\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sec^2(x)}{(\mathrm{tg}(x)-1)(\mathrm{tg}(x)-2)^2}\mathrm{d}x.$$

Fazendo a substituição $t = \mathrm{tg}\,x$, temos $dt = \sec^2 x\,dx$,

$x = -\pi/3 \Rightarrow t = -\sqrt{3}$ e $x = \pi/6 \Rightarrow t = 1/\sqrt{3}$.

Assim, a integral fica $\displaystyle\int_{-\sqrt{3}}^{1/\sqrt{3}} \frac{1}{(t-1)(t-2)^2}\,dt$

Agora, $\dfrac{1}{(t-1)(t-2)^2} = \dfrac{A}{t-1} + \dfrac{B}{t-2} + \dfrac{C}{(t-2)^2} = \dfrac{A(t-2)^2 + B(t-1)(t-2) + C(t-1)}{(t-1)(t-2)^2}$

Resolvendo o sistema, obtemos $A = 1$, $B = -1$ e $C = 1$.

Portanto,

$$\int_{-\sqrt{3}}^{1/\sqrt{3}} \frac{1}{(t-1)(t-2)^2}\,dt = \int_{-\sqrt{3}}^{1/\sqrt{3}} \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t-2} + \frac{1}{(t-2)^2}\right)dt = \left(\ln|t-1| - \ln|t-2| - \frac{1}{t-2}\right)\Bigg|_{-\sqrt{3}}^{1/\sqrt{3}}$$

$$= \ln\left(1-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) - \ln\left(2-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) - \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{3}}-2} - \ln(1+\sqrt{3}) + \ln(2+\sqrt{3}) - \frac{1}{\sqrt{3}+2}$$

3. **(1,5)** Seja $F(x) = \int_0^{\sqrt{x}} (x+t^2)e^{t^2}\,\mathrm{d}t$, $x > 0$. Determine $F'(x)$ e $F''(x)$.

$F(x) = x\displaystyle\int_0^{\sqrt{x}} e^{t^2}dt + \int_0^{\sqrt{x}} t^2 e^{t^2}dt$. As funções e^{t^2} e $t^2e^{t^2}$ são contínuas. Pelo TFC,

$$F'(x) = \int_0^{\sqrt{x}} e^{t^2}dt + x\cdot e^x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} + xe^x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \int_0^{\sqrt{x}} e^{t^2}dt + \sqrt{x}e^x$$

e

$$F''(x) = e^x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2\sqrt{x}}e^x + \sqrt{x}e^x = e^x\left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{x}\right)$$