GABARITO P1 - 2013

Álgebra Linear II - MAT2458

1	D
2	B
3	E
4	A
5	D
6	A
7	E
8	B
9	C
10	B
11	E
12	A
13	B
14	B
15	E
16	B

PoliShare

MAT2458 - Álgebra Linear para Engenharia II

Prova 1 - 11/09/2013

Nome: _____ **NUSP:** _____

Professor: _____ **Turma:** _____

INSTRUÇÕES

(1) A prova tem início às 7:30 e duração de 2 horas.
(2) Não é permitido deixar a sala sem entregar a prova.
(3) Todo material não necessário à prova (mochilas, bolsas, calculadoras, agasalhos, bonés, celulares, livros, etc.) deve ficar na frente da sala.
(4) Sobre a carteira devem permanecer apenas lápis, caneta, borracha e documento de identidade com foto.
(5) É permitida a entrada na sala até as 8:00 e não é permitida a saída da sala antes das 8:40.
(6) As respostas devem ser transferidas para a folha óptica durante as 2 horas de prova (não há tempo extra para o preenchimento da folha óptica).
(7) Só destaque o gabarito do aluno (última folha) quando for entregar a prova. Não esqueça de anotar o tipo de prova no gabarito do aluno (para que você possa depois conferir suas respostas com o gabarito oficial).
(8) A folha óptica deve ser preenchida com caneta esferográfica azul ou preta.
(9) Para o correto preenchimento da folha óptica siga o exemplo abaixo.



Notações: Nesta prova, se V é um espaço vetorial, o vetor nulo de V será denotado por 0_V e se $v_1, \ldots, v_n$ são vetores de V, o subespaço vetorial de V gerado por eles será denotado por $[v_1, \ldots, v_n]$.

Se V estiver munido de um produto interno, S for um subespaço de V e para $v \in V$, a projeção ortogonal de v sobre S existir, ela será denotada por $\text{proj}_S\, v$.

Para um inteiro não negativo n, $P_n(\mathbb{R})$ denota o espaço vetorial de todos os polinômios de grau $\leq n$, incluindo o polinômio nulo. O espaço vetorial de todos os polinômios será denotado por $P(\mathbb{R})$.

Dado um intervalo I contido em $\mathbb{R}$, o espaço vetorial de todas as funções $f\colon I \to \mathbb{R}$ contínuas será denotado por $\mathscr{C}(I)$.

Questão 1. Sejam V e W subespaços vetoriais de dimensão finita de um espaço vetorial E. Considere as seguintes afirmações:

(I) A soma $V + W$ é direta se, e somente se, $\dim(V + W) = \dim V + \dim W$.

(II) Se $\dim(V \cap W) = 1$, então a união de uma base de V com uma base de W é um conjunto gerador de $V + W$.

(III) Se $\dim(V \cap W) = 0$, então a união de uma base de V com uma base de W é sempre um conjunto linearmente independente em E.

Está correto o que se afirma em

a. (I) e (III), apenas.

b. (I) e (II), apenas.

c. (II), apenas.

d. (I), (II) e (III).

e. (II) e (III), apenas.

Questão 2. Considere a transformação linear $T\colon P_3(\mathbb{R}) \to P_3(\mathbb{R})$, definida por $T(f) = f + f'$, para todo $f \in P_3(\mathbb{R})$, onde f' denota a derivada de f. É correto afirmar que

a. $\dim(\operatorname{Ker} T) = 1$, e T é sobrejetora.
b. T é injetora e sobrejetora.
c. T é injetora, e $\dim(\operatorname{Ker} T) = 1$.
d. $\dim(\operatorname{Ker} T) = 1$, e $\dim(\operatorname{Im} T) = 3$.
e. T é injetora, e $\dim(\operatorname{Im} T) = 2$.

Questão 3. Seja E um espaço vetorial de dimensão finita com produto interno e seja Y um subespaço vetorial de E. Considere as seguintes afirmações:

(I) Para qualquer $x \in E$, existem únicos $y \in Y$ e $z \in Y^{\perp}$ tais que $x = y + z$.
(II) Se $\dim Y = 3$ e $\dim Y^{\perp} = 2$, então existe uma transformação linear $T\colon E \to E$ tal que $\operatorname{Ker} T = Y^{\perp}$ e $\operatorname{Im} T = Y$.
(III) Se $\dim Y = 1$ e $\dim E = 4$, então existe uma transformação linear $T\colon E \to E$ tal que $\operatorname{Ker} T = \operatorname{Im} T = Y$.

Está correto o que se afirma em

a. (II) e (III), apenas.
b. (I), (II) e (III).
c. (I), apenas.
d. (I) e (III), apenas.
e. (I) e (II), apenas.

Questão 4. Considere o espaço vetorial $M_2(\mathbb{R})$ munido do produto interno usual, ou seja,

$$\left\langle \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} \right\rangle = aa' + bb' + cc' + dd'$$

para todos $a, a', b, b', c, c', d, d' \in \mathbb{R}$. Seja $T\colon M_2(\mathbb{R}) \to M_2(\mathbb{R})$ uma transformação linear que satisfaz

$$T\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad T\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

e

$$\operatorname{Im} T = \left[\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \right].$$

Assinale a alternativa correta acerca de T.

a. $\operatorname{Ker} T = (\operatorname{Im} T)^{\perp}$.

b. $(\operatorname{Im} T)^{\perp} \subset \operatorname{Ker} T$, mas $\operatorname{Ker} T \neq (\operatorname{Im} T)^{\perp}$.

c. $\operatorname{Ker} T \subset \operatorname{Im} T$, mas $\operatorname{Ker} T \neq \operatorname{Im} T$.

d. $\operatorname{Ker} T \subset (\operatorname{Im} T)^{\perp}$, mas $\operatorname{Ker} T \neq (\operatorname{Im} T)^{\perp}$.

e. $\operatorname{Ker} T = \operatorname{Im} T$.

Questão 5. Considere as seguintes afirmações acerca de um espaço vetorial E com produto interno $\langle\ ,\ \rangle$:

(I) Se $\{e_1,\ldots,e_n\}$ é uma base ortonormal de E e se, dado $x \in E$, temos $\langle x, e_i\rangle = 0$, para todo $i = 1,\ldots,n$, então $x = 0_E$.

(II) Se Y e Z são subespaços vetoriais de E tais que $E = Y \oplus Z$, então $Z = Y^{\perp}$ e $Y = Z^{\perp}$.

(III) Se Y e Z são subespaços vetoriais de E tais que $E = Y \oplus Z$, e se B e C são bases ortonormais de Y e de Z, respectivamente, então $B \cup C$ é uma base ortonormal E.

Está correto o que se afirma em

a. (I) e (II), apenas.
b. (I) e (III), apenas.
c. (II) e (III), apenas.
d. (I), apenas.
e. (III), apenas.

Questão 6. Assinale a alternativa que contém a definição de uma função T que **NÃO** é uma transformação linear.

a. $T\colon M_2(\mathbb{R}) \to M_2(\mathbb{R})$ dada por $T(A) = AA^{\mathrm{t}}$, para toda $A \in M_2(\mathbb{R})$, onde A^{t} denota a matriz transposta de A.
b. $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, dada por $T(x,y,z) = \mathrm{proj}_Y(x,y,z)$, para todo $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$, onde $Y = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+z = 0\}$.
c. $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, dada por $T(x,y) = (x+2y, x-4y)$, para todo $(x,y) \in \mathbb{R}^2$.
d. $T\colon P(\mathbb{R}) \to P(\mathbb{R})$, dada por $T(p) = 2p + p'$, para todo $p \in P(\mathbb{R})$, onde p' denota a derivada de p.
e. $T\colon \mathscr{C}([0,2]) \to \mathbb{R}$, dada por $T(f) = f(1) + \int_0^2 f(t)dt$, para toda $f \in \mathscr{C}([0,2])$.

Questão 7. Seja V um espaço vetorial de dimensão finita com produto interno e seja S um subespaço vetorial de V. Assinale a alternativa correta acerta do operador linear $T\colon V \to V$ definido por $T(v) = \text{proj}_S\, v$, para todo $v \in V$.

a. $\text{Ker}\, T = S$ e $\text{Im}\, T = S^{\perp}$.
b. $\text{Ker}\, T = \text{Im}\, T = S$.
c. $V \neq \text{Ker}\, T + \text{Im}\, T$ e $\text{Ker}\, T \cap \text{Im}\, T \neq \{0_V\}$.
d. $\text{Ker}\, T \cap \text{Im}\, T = \{0_V\}$ e $V \neq \text{Ker}\, T + \text{Im}\, T$.
e. $\text{Ker}\, T = S^{\perp}$ e $\text{Im}\, T = S$.

Questão 8. Seja E um espaço vetorial com produto interno $\langle\ ,\ \rangle$ e seja $\|\ \|$ a norma associada. Considere as seguintes afirmações:

(I) $-\|x\|\|y\| \leq \langle x, y\rangle$ para todos x, y em E.
(II) $\langle x, y\rangle \leq \|x\|\|y\|$ para todos x, y em E.
(III) Se x e y são vetores não nulos de E que satisfazem $\langle x, y\rangle = 0$, então $\{x, y\}$ é linearmente independente.

Está correto o que se afirma em

a. (I) e (II), apenas.
b. (I), (II) e (III).
c. (II), apenas.
d. (I) e (III), apenas.
e. (II) e (III), apenas.

Questão 9. Se $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ é a transformação linear definida por

$$T(x,y,z) = (x, 2x+y-z, -x, x+y+z),$$

para todo $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$, então $\dim(\operatorname{Im} T)$ e $\dim(\operatorname{Ker} T)$ são iguais a, respectivamente,

a. 3 e 1.
b. 2 e 1.
c. 3 e 0.
d. 1 e 2.
e. 2 e 0.

Questão 10. Considere o espaço vetorial $\mathscr{C}([-\pi,\pi])$ munido do produto interno

$$\langle f, g\rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(t)g(t)dt,$$

para todos $f, g \in \mathscr{C}([-\pi,\pi])$. Então, a melhor aproximação afim g (ou seja, da forma $g(t) = at + b$, com $a, b \in \mathbb{R}$) da função $f(t) = \operatorname{sen} t$ em $[-\pi,\pi]$ é

a. $g(t) = -\frac{1}{\pi^2}t$
b. $g(t) = \frac{3}{\pi^2}t$
c. $g(t) = \frac{2}{\pi^2}t - \frac{1}{\pi}$
d. $g(t) = -\frac{2}{\pi^2}t + \frac{1}{\pi}$
e. $g(t) = \frac{1}{\pi^2}t$

Questão 11. Seja $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ a transformação linear tal que $T(2,3) = (4,6)$ e $T(1,1) = (2,-1)$. Se $T(x,y) = (a,b)$, então $a+b$ é igual a

a. $-7x - 8y$.
b. $11x - 8y$.
c. $11x + 8y$.
d. $-11x - 8y$.
e. $-7x + 8y$.

Questão 12. Seja $T\colon P_3(\mathbb{R}) \to M_2(\mathbb{R})$ a transformação linear definida por

$$T(a+bt+ct^2+dt^3) = \begin{pmatrix} 2a+5b-c & -a-3b+c+d \\ a+2c+5d & 3a+7b-c+d \end{pmatrix},$$

para todos $a,b,c,d \in \mathbb{R}$. Então, $\dim(\operatorname{Ker} T)$ e $\dim(\operatorname{Im} T)$ são iguais a, respectivemente,

a. 2 e 2.
b. 3 e 1.
c. 1 e 3.
d. 0 e 4.
e. 1 e 2.

Questão 13. Dado um espaço vetorial V, sabe-se que uma função

$$\langle\ ,\ \rangle\colon V \times V \to \mathbb{R}$$

é um produto interno se, e somente se, estiverem satisfeitas:

(i) $\langle u, v\rangle = \langle v, u\rangle$, para todos $u, v \in V$;
(ii) $\langle u + v, w\rangle = \langle u, w\rangle + \langle v, w\rangle$, para todos $u, v, w \in V$;
(iii) $\langle \lambda u, v\rangle = \lambda\langle u, v\rangle$, para todo $\lambda \in \mathbb{R}$ e todos $u, v \in V$; e
(iv) para todo $u \in V$, $\langle u, u\rangle \geq 0$ e $\langle u, u\rangle = 0_V$ se, e somente se, $u = 0_V$.

Se $V = \mathbb{R}^2$, a respeito da função $\langle\ ,\ \rangle\colon \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, dada por

$$\langle(\alpha_1, \alpha_2), (\beta_1, \beta_2)\rangle = \det\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \beta_1 & \beta_2 \end{pmatrix},$$

para todos $(\alpha_1, \alpha_2), (\beta_1, \beta_2) \in \mathbb{R}^2$, é correto afirmar que $\langle\ ,\ \rangle$

a. é um produto interno em $\mathbb{R}^2$.
b. não satisfaz (i) nem (iv).
c. não satisfaz (ii) nem (iv).
d. satisfaz (i) e (ii), apenas.
e. satisfaz (ii) e (iv), apenas.

Questão 14. Considere o espaço vetorial $P_2(\mathbb{R})$ munido do produto interno

$$\langle p, q\rangle = \int_0^1 p(t)q(t)dt,$$

para todos $f, g \in P_2(\mathbb{R})$. Considere, em $P_2(\mathbb{R})$, o seguinte subespaço vetorial:

$$V = \{p \in P_2(\mathbb{R}) : p(1) = p(-1)\}.$$

Então, uma base ortonormal de V é

a. $\left\{1,\ \frac{3\sqrt{5}}{2}t^2\right\}$.
b. $\left\{1,\ \frac{3\sqrt{5}}{2}\left(t^2 - \frac{1}{3}\right)\right\}$.
c. $\left\{1,\ 2t,\ \frac{3\sqrt{5}}{2}\left(t^2 - \frac{1}{3}\right)\right\}$.
d. $\left\{\frac{3\sqrt{5}}{2},\ 2t,\ t^2 - \frac{1}{3}\right\}$.
e. $\left\{\frac{3\sqrt{5}}{2},\ t^2 - \frac{1}{3}\right\}$.

Questão 15. Considere as afirmações abaixo.

(I) Existe um operador linear $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ que é injetor mas não é sobrejetor.

(II) Existe uma transformação linear $T\colon P_4(\mathbb{R}) \to M_{2\times 3}(\mathbb{R})$ sobrejetora.

(III) Para todo $n > 0$, existe uma transformação linear $T\colon \mathscr{C}([0,1]) \to \mathbb{R}^n$ injetora.

A respeito dessas afirmações, é correto afirmar que

a. apenas (II) e (III) são falsas.
b. apenas (III) é falsa.
c. apenas (I) e (III) são falsas.
d. apenas (II) é falsa.
e. (I), (II) e (III) são falsas.

Questão 16. Sejam V e W os subespaços vetoriais de $P_3(\mathbb{R})$ definidos por

$$V = [1+t^2, t+t^2, 1-t] \quad \text{e} \quad W = [t, t^3].$$

Então, $\dim(V \cap W)$ e $\dim(V+W)$ são iguais a, respectivamente,

a. 1 e 4.
b. 0 e 4.
c. 2 e 2.
d. 0 e 3.
e. 1 e 3.

Gabarito do Aluno

Nome: _____ **NUSP:** _____

Tipo de prova: _____

Questão	a	b	c	d	e
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐
11	☐	☐	☐	☐	☐
12	☐	☐	☐	☐	☐
13	☐	☐	☐	☐	☐
14	☐	☐	☐	☐	☐
15	☐	☐	☐	☐	☐
16	☐	☐	☐	☐	☐